

# MINIKIT-IMPFKALENDER

Alter	(in Wochen)	Säugling (in Monaten)			Kleinkind (in Monaten)		Kinder (in Jahren)			Jugendliche (in Jahren)		Erw. (in Jahren)
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-11	12-17	ab 18
<b>Vorsorgeuntersuchung</b>			<b>U4</b>		<b>U6</b>	<b>U7</b>	<b>U7a/8</b>	<b>U7</b>			<b>J1</b>	
Tetanus (Wundstarrkrampf)		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f (alle 10 Jahre ggf. N)
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f (alle 10 Jahre ggf. N)
Keuchhusten (Pertussis)		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		A f (ggf. N)
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1	G2 a	G3	G4	N				A1		ggf. N
Hepatitis B		G1	G2 a	G3	G4	N						
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1	G2 a	G3	G4	N						
Pneumokokken		G1		G2	G3	N						
Rotaviren	G1 b	G2	[G3]									
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)		N					
Masern					G1	G2	N					S d
Mumps-Röteln					G1	G2	N					
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV)												S e
Influenza												

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4)

S Standardimpfung

A Auffrischimpfung

N Nachholimpfung

U Früherkennungsuntersuchung

J Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12-14 Jahren)

a Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich

c Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen

d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.

e Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen

f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung